

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|-----|-------|------------|------------|-----|-------|-------|------------|--------------|-----------------|------------|-------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 32 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/dl | | | | 17-OHP(直接) | ≧ | 10 | ng/dl | | | | |
| 33 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | | | | | |
| 34 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4.5 | ng/dl | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/dl | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/dl | | | | | | |
| 35 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | | | | | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5.8 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3 | ng/ml | | | | | | |
| 37 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 50 | ng/ml | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | or | 17-OHP(抽出) | ≧ | 8 | ng/ml | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | & | 出生体重 | ≧ | 2000 | g | |
| 38 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 20 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | or | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| 40 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | | | | | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 30 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | or | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| 42 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 1 | ng/ml | | 21-DOF | ≧ | 1 | ng/ml | |
| | | | | | | | | | | | | & | (17-OHP+4-AD)/F | ≧ | 0.1 | ratio | or | 在胎週数 | < | 37 | week |
| | | | | | | | | | | | | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.3 | ratio | & | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 30 | ng/ml |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | or | 在胎週数 | ≧ | 37 | week |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | & | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 20 | ng/ml |
| 43 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | | | | | |
| 49 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| 54 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | | | | | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | | | | | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | & | 出生体重 | ≧ | 2000 | g | & | 出生体重 | ≧ | 2000 | g |
| 67 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 2.5 | ng/dl | | 17-OHP(直接) | ≧ | 30 | ng/ml | |
| | | | | | | | | | | | | & | (17-OHP+4-AD)/F | > | 0.1 | ratio | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | & | 11-DOF/17-OHP | < | 0.2 | ratio | | | | | |
| 69 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5.5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5.5 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 2.5 | ng/ml | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | & | (17-OHP+4-AD)/F | ≧ | 0.1 | ratio | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.2 | ratio | | | | | |
| 71 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| 73 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 1 | ng/ml | | | | | | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 97 | %ile | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 97 | %ile | | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.3 | ratio | | | | | |
| 75 | | | | | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5.8 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 7 | ng/ml | | |
| 76 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 6 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 6 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 4 | ng/ml | | | | | | |
| 78 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | |
| 82 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 3.5 | ng/ml | | 17-OHP(抽出) | ≧ | 10 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 5 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 2 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 5 | ng/ml | |
| | or | 17-OHP(直接) | ≧ | 95 | %ile | | | | | | | & | (17-OHP+4-AD)/F | ≧ | 0.2 | ratio | & | (17-OHP+4-AD)/F | ≧ | 0.2 | ratio |
| | | | | | | | | | | | | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.4 | ratio | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.4 | ratio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | or | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 5 | ng/ml |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | & | 21-DOF | ≧ | 1 | ng/ml |
| 84 | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(直接) | ≧ | 4 | ng/ml | | 17-OHP(LCMS) | ≧ | 1 | ng/ml | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | & | (17-OHP+4-AD)/F | ≧ | 0.1 | ratio | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | & | 11-DOF/17-OHP | ≧ | 0.3 | ratio | | | | | |

初回採血のカットオフ値は抽出法で3.5ですが、再採血のカットオフ値は4.0です。即精密は低出生体重児を除く。

低出生体重児に対する判定基準あり

即精検値：低体重児を除く

即精査：17-OHP（直接）≧20ng/ml
休前日の普通体重・哺乳児の児についてのみ適応

