

結果年度：【2024年】

疑い疾患名： 先天性甲状腺機能低下症

	一次検査 カットオフ値					確認検査 カットオフ値					二次検査 カットオフ値 (実施施設のみ記載)					即検査 カットオフ値					備考
機器No	・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					
1		TSH	≧	6.5	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
3		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
6		TSH	≧	7.95	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	97	%ile																
7		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	3	%ile																
8		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml						TSH	≧	30	μU/ml		
	or	FT4	<	1	ng/dl	or	FT4	<	0.9	ng/dl					or	FT4	<	0.9	ng/dl		
10		TSH	>	10	μU/ml		TSH	>	10	μU/ml											
13		TSH	≧	9	μU/ml		TSH	≧	9	μU/ml						TSH	≧	25	μU/ml		
14		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	8	μU/ml						TSH	≧	16	μU/ml		
	or	TSH	≧	97	%ile																
16		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	97	%ile																
17		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	97	%ile																
20		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml						TSH	≧	25	μU/ml		
	or	TSH	≧	97	%ile																
21		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	95	%ile																
22		TSH	≧	10	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml						TSH	≧	30	μU/ml		
	or	TSH	≧	95	%ile																
	or	FT4	<	1	ng/dl																
23		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	8	μU/ml											
24		TSH	≧	6.5	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml						TSH	≧	25	μU/ml		
	or	TSH	≧	96	%ile																
25		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	8	μU/ml											
	or	TSH	≧	95	%ile																
27		TSH	≧	10	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
28		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	9	μU/ml											
	or	TSH	≧	96	%ile																
29		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	9.5	μU/ml											
	or	TSH	≧	97	%ile																
30		TSH	≧	7	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	95	%ile																
31		TSH	≧	10	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	>	95	%ile																
32		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	8	μU/ml						TSH	≧	25	μU/ml		
33		TSH	≧	9	μU/ml		TSH	≧	9	μU/ml											
34		TSH	≧	8.5	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
35		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	95	%ile																
37		TSH	≧	6.5	μU/ml		TSH	≧	7.5	μU/ml											
38		TSH	≧	8	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	95	%ile																
40		TSH	≧	6	μU/ml		TSH	≧	10	μU/ml											
	or	TSH	≧	97	%ile																

42			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
43			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	9.5	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
47			TSH	iv	7.95	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
48			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
	or		TSH	iv	95	%ile																
49			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
54			TSH	iv	9.4	μU/ml			TSH	iv	9.4	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
57			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		17-OHP(直接)	iv	95	%ile																
59			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
	or		TSH	iv	95	%ile																
60			TSH	>	10	μU/ml			TSH	>	10	μU/ml										
62			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	25	μU/ml	
64			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	8	μU/ml										
65			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	※FT4は2000 g 未満は即精査なし ※FT4は2024年12月から測定
	or		TSH	iv	95	%ile	or		FT4	iv	0.9	ng/dl					or	FT4	iv	0.6	ng/dl	
	or		FT4	iv	0.9	ng/dl																
	or		FT4	iv	95	%ile																
66			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
67			TSH	iv	10	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
68			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		TSH	iv	96	%ile																
69			TSH	iv	10	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		FT4	<	0.9	ng/dl	or		FT4	<	0.9	ng/dl										
71			TSH	iv	10	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
73			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
74			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	8	μU/ml										
	or		TSH	iv	97	%ile																
75			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml										
76			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
78			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml										
	or		TSH	iv	95	%ile																
80			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	25	μU/ml	
81			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		TSH	iv	95	%ile																
82			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		TSH	iv	95	%ile											or	FT4	<	0.5	ng/dl	
83			TSH	iv	9.4	μU/ml			TSH	iv	9.4	μU/ml						or	FT4	iv	5	ng/dl
	or		TSH	iv	97	%ile												TSH	iv	18.8	μU/ml	
84			TSH	iv	8	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml						TSH	iv	30	μU/ml	
	or		出生体重	<	2000	g	or		出生体重	<	2000	g					or	出生体重	<	2000	g	
	&		FT4	<	0.7	ng/dl	&		FT4	<	0.7	ng/dl					&	FT4	<	0.3	ng/dl	
	or		出生体重	iv	2000	g	or		出生体重	iv	2000	g					or	出生体重	iv	2000	g	
85			TSH	iv	10	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
			TSH	iv	10	μU/ml			TSH	iv	10	μU/ml										
86			TSH	iv	7	μU/ml			TSH	iv	9.5	μU/ml						TSH	iv	20	μU/ml	
	or		TSH	iv	97	%ile																
87			TSH	iv	9	μU/ml			TSH	iv	9	μU/ml						TSH	iv	40	μU/ml	
	or		TSH	iv	95	%ile	or		TSH	iv	99	%ile										

※FT4は2000 g 未満は即精査なし
 ※FT4は2024年12月から測定

[illegible]

カットオフ値 登録情報

結果年度：【2024年】
疑い疾患名： 先天性副腎過形成症

	一次検査 カットオフ値				確認検査 カットオフ値				二次検査 カットオフ値 (実施施設のみ記載)				即検査 カットオフ値				備考				
機器No	・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者				・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者				・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者				・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者								
1		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml						
3		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		11-DOF	≧	4	ng/ml						
6		17-OHP(直接)	≧	3.7	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml						
7		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml						
8		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml	17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml		
10		17-OHP(直接)	>	5	ng/ml		17-OHP(直接)	>	5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	>	1	ng/ml						
											&	(17-OHP+4-AD)/F	>	0.1	ratio						
											&	11-DOF/17-OHP	<	0.3	ratio						
13		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.1	ratio	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.3	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	2	ratio	
																&	21-DOF	≧	1	ng/ml	
14		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	20	ng/ml	17-OHP (LCMS) 在胎37週未満は≧30.0ng/mlを即精査とする
	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	or	21-DOF	≧	1	ng/ml	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio						
16		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
17		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
20		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	50	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile											or	17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml	
21		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/dl		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/dl		17-OHP(抽出)	≧	2.5	ng/dl						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
22		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
23		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		11-DOF	≧	2	ng/ml						
24		17-OHP(直接)	≧	6.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	6.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/dl	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile						&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	
																&	21-DOF	≧	1	ng/dl	
25		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
27		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	1.8	ng/ml						
28		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
29		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml						
30		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
31		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	>	95	%ile																
32		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/dl							17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml	
33		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml						
34		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/dl		17-OHP(直接)	≧	5	ng/dl		17-OHP(直接)	≧	5	ng/dl						
35		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml						
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
37		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	50	ng/ml	
																or	17-OHP(抽出)	≧	8	ng/ml	
																&	出生体重	≧	2000	g	

38		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
40		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile										
42		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml					
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio					
												&	17-OHP(抽出)	≧	0.3	ratio				
43		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml					
47		17-OHP(直接)	≧	3.7	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml					
48		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
49		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml
54		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
57		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/dl		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/dl		17-OHP(抽出)	≧	2.5	ng/dl		17-OHP(抽出)	≧	8	ng/dl
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
59		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
60		17-OHP(直接)	>	5	ng/ml		17-OHP(直接)	>	5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	>	1	ng/ml					
											&	(17-OHP+4-AD)/F	>	0.1	ratio					
												&	11-DOF/17-OHP	<	0.3	ratio				
62		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.1	ratio
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.3	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	2	ratio
																	&	21-DOF	≧	1
64		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio	&	17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	&	21-DOF	≧	1	ng/ml
65		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	20	ng/ml
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile											or	17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml
66		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
67		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	2.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml
											&	(17-OHP+4-AD)/F	>	0.1	ratio	&	21-DOF	>	2	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	<	0.2	ratio					
68		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	10	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	30	ng/ml
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile											or	17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml
69		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	2.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	50	ng/ml
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio	or	21-DOF	≧	2	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	<	0.2	ratio	or	在胎週数	≧	37	week
																&	17-OHP(LCMS)	≧	20	ng/ml
71		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	2.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	20	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.2	ratio	&	在胎週数	≧	37	week
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio	or	17-OHP(LCMS)	≧	50	ng/ml
																or	21-DOF	≧	2	ng/ml
73		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile															
74		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	1	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	&	17-OHP(抽出)	≧	0.3	ratio					
75		17-OHP(直接)	≧	5.8	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5.8	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3	ng/ml					
76		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml					
78		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml					
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile										
80		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.1	ratio

2024年10月からステロイド分析を開始しました。

※2500 g 未満は即精査なし

80											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.3	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	2	ratio	
																&	21-DOF	≧	1	ng/ml	
81		17-OHP(直接)	≧	4.5	ng/ml							17-OHP(抽出)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile																
82		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	3.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	>	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	>	5	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile						&	(17-OHP+4-AD)/F	>	0.2	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	>	2	ratio	
											&	11-DOF/17-OHP	<	0.4	ratio	&	11-DOF/17-OHP	<	0.1	ratio	
																or	17-OHP(LCMS)	>	5	ng/ml	
																&	21-DOF	>	1	ng/ml	
83		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	2	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile						&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.2	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.2	ratio	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	
																or	17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
84		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml		21-DOF	≧	1	ng/ml	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio	or	在胎週数	<	37	week	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	17-OHP(LCMS)	≧	30	ng/ml	
																or	在胎週数	≧	37	week	
																&	17-OHP(LCMS)	≧	20	ng/ml	
85		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	2.5	ng/ml						
86		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml	
87		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	6	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	9	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	30	ng/ml	栄研およびシーメンズの2試薬で&判定
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile											&	17-OHP(直接)	≧	30	ng/ml	
92		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.1	ratio	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.3	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	2	ratio	
96		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml							17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.1	ratio	or	21-DOF	≧	1	ng/ml	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	or	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.2	ratio	
																&	11-DOF/17-OHP	≧	0.4	ratio	
112		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	20	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	or	17-OHP(直接)	≧	97	%ile	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	or	21-DOF	≧	1	ng/ml	
113		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	5	ng/ml		17-OHP(抽出)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	50	ng/ml	
	or	17-OHP(直接)	≧	95	%ile											or	17-OHP(抽出)	≧	10	ng/ml	
153		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(直接)	≧	4	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	1.5	ng/ml		17-OHP(LCMS)	≧	5	ng/ml	
											&	11-DOF/17-OHP	≧	0.3	ratio	&	11-DOF/17-OHP	≧	0.1	ratio	
											&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	0.3	ratio	&	(17-OHP+4-AD)/F	≧	2	ratio	
																&	21-DOF	≧	1	ng/ml	

カットオフ値 登録情報

結果年度：【2024年】
疑い疾患名： ガラクトース血症

	一次検査 カットオフ値					確認検査 カットオフ値					二次検査 カットオフ値 (実施施設のみ記載)					即検査 カットオフ値					備考
機器No	・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					・カットオフ値は不等号も含めて記載 ・絶対値、パーセンタイル値のいずれか又は両者					
1		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	4	mg/dl											
	or	Gal-1-P	≧	14	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
3		Gal	≧	2.5	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
6		Gal	≧	2.5	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	8	mg/dl	or	T-Gal	≧	10	mg/dl											
						or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
7		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	10	mg/dl	or	T-Gal	≧	10	mg/dl											
	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
8		Gal	>	2.5	mg/dl		Gal	>	3	mg/dl						Gal	>	10	mg/dl		
	or	Gal-1-P	>	13	mg/dl	or	Gal-1-P	>	15	mg/dl											
10		Gal	>	3	mg/dl		Gal	>	3	mg/dl											
	or	Gal-1-P	>	15	mg/dl	or	Gal-1-P	>	15	mg/dl											
13		Gal	≧	6.5	mg/dl		Gal	≧	8	mg/dl											
	or	Gal-1-P	≧	22	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	25	mg/dl											
14		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl						Gal	≧	10	mg/dl		
	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl					or	Gal-1-P	≧	25	mg/dl		
16		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	6	mg/dl											
						or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
17		Gal	≧	2.5	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	6.45	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	97	%ile																
20		Gal	≧	2	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	Gal	≧	97	%ile																
21		T-Gal	≧	4	mg/dl		T-Gal	≧	7	mg/dl											
	or	Gal	≧	4	mg/dl	or	Gal	≧	3	mg/dl											
						or	Gal-1-P	≧	10	mg/dl											
22		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	Gal-1-P	≧	10	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	10	mg/dl											
23		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
24		Gal	≧	2	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl						Gal	≧	10	mg/dl		
	or	Gal-1-P	≧	10	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
25		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	Gal	≧	95	%ile	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl																
27		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
28		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	3	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	10	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
29		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	6	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	7	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
	or	Gal	≧	95	%ile																
30		Gal	≧	4	mg/dl		Gal	≧	4	mg/dl											
	or	Gal	≧	95	%ile																
31		Gal	≧	3	mg/dl		Gal	≧	5	mg/dl											
	or	T-Gal	≧	5	mg/dl	or	Gal-1-P	≧	15	mg/dl											
	or	T-Gal	>	97	%ile																
32		T-Gal	≧	9.5	mg/dl		T-Gal	≧	9.5	mg/dl						T-Gal	≧	9.5	mg/dl	即精査のカットオフは以下の通りです。	

[illegible]